




Até 96% dos pacientes oncológicos podem apresentar intercorrências que afetam a nutrição.^{1,2}

Cirurgias de grande porte, como as oncológicas do TGI*, apresentam taxas elevadas de complicações.^{3,4}

Os guidelines ESPEN e ASPEN* recomendam:^{5,6} fórmulas com imunonutrientes** nível forte de evidência para uso em pacientes oncológicos submetidos a ressecção no trato gastrointestinal.


**arginina, ácidos graxos ômega 3 e nucleotídeos

*Recomendada para pacientes desnutridos



*TGI= Trato gastrointestinal | **CHF: Franco-suíço

Até
80%
dos pacientes com câncer apresentam alteração do estado nutricional.⁸



Estudos mostram taxas de até:

- 23% disfagia ou odinofagia¹
- 39% náusea e/ou vômitos¹
- 40,5% disgeusia²
- 41% saciedade precoce¹
- 50% diarreia¹
- 71% anorexia²

FÓRMULA HIPERPROTEICA⁷ COM ARGININA, ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 E NUCLEOTÍDEOS

Pacientes com cirurgia do TGI e/ou grande porte ou cirúrgico desnutrido ou em risco nutricional.

SUGESTÃO DE USO:

Oral IMPACT[®] 200 mL
3 unidades por dia

PRÉ-OPERATÓRIO
5 a 7 dias antes da cirurgia

Enteral IMPACT[®]
1 litro por dia

PÓS-OPERATÓRIO
7 a 10 dias após da cirurgia



NÃO CONTÉM GLÚTEN

A DESNUTRIÇÃO ASSOCIADA
AO CÂNCER CAUSA SÉRIAS
CONSEQUÊNCIAS:⁸

Piora da qualidade
de vida

Redução da resposta à
quimioterapia

Menor tempo de
sobrevida

Aumento do:

Risco de
toxicidade induzida
pela quimioterapia

Risco de complicações
pós-operatórias

FÓRMULAS HIPERCALÓRICAS⁷ E/OU HIPERPROTEICAS⁷



2.0
kcal/ml
17
g de proteína/
unidade



1.5
kcal/ml
11
g de proteína/
unidade



1.5
kcal/ml
20
g de proteína/
unidade



sem sabor
1.0
kcal/ml*
20
g de proteína/
55g**

NÃO CONTÉM GLÚTEN

* Na diluição padrão
** Sugestão de uso 27,5 g 2 x ao dia.

FIBRAS SOLÚVEIS E PROBIÓTICO



CONTÉM GLÚTEN



100%
fibra solúvel,
com goma guar
(solúvel) e inulina
(prebiótico)



NÃO CONTÉM GLÚTEN

Fibra solúvel
com goma guar
e inulina, e com
o probiótico
*Lactobacillus
reuteri*

ESPESSANTE

À BASE DE
GOMA XANTANA



Lata
125 g
Display com
28,8 g
(24 sachês com 1,2 g)

NÃO CONTÉM GLÚTEN

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL



NÃO CONTÉM GLÚTEN

O Programa **Nutrição Até Você** oferece a linha de produtos
Nestlé Health Science para o paciente domiciliar.

Referências Bibliográficas: 1. Sanz Ortiz J, Moreno Nogueira JA, García de Lorenzo y Mateos A. Protein energy malnutrition (PEM) in cancer patients. Clin Transl Oncol. 2008 ;10:579-82. 2. BOZZETTI, F.; SCRINIO WORKING GROUP. Screening the nutritional status in oncology: a preliminary report on 1,000 outpatients. Supportive care in cancer 2009;17:279-284. 3. Cerantola Y, Hübner M, Grass F et al. Immunonutrition in gastrointestinal surgery. Br J Surg. 2011;98:37-48. 4. Drover JW, Dhaliwal R, Weitzel L et al. Perioperative use of arginine-supplemented diets: a systematic review of the evidence. J Am Coll Surg. 2011;212:385-99, 399.e1. 5. August DA1, Huhmann MB; American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.) Board of Directors. A.S.P.E.N. clinical guidelines: nutrition support therapy during adult anticancer treatment and in hematopoietic cell transplantation. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009 ;33:472-500. 6. Arends J, Bachmann P, Baracos V et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clin Nutr. 2016;6. pii: S0261-561430181-9. 7. Lochs, H et al. Introductory to the ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition. Clin Nutr. 2006 25:180-186. 8. Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, Associação Brasileira de Nutrologia. Terapia Nutricional na Oncologia . Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Projeto Diretrizes (DITEN), 2011.



Onde comprar:
www.nutricaoatevoce.com.br

Para mais informações, acesse: www.nestlehealthscience.com.br
Serviço de atendimento ao profissional de saúde 0800-7702461 - SMS 25770.
Para solucionar dúvidas, entre em contato com seu representante.

Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.