

PEPTAMEN®

Atingir a meta proteica ficou mais fácil.

Situações
críticas

Com Peptamen Intense, os pacientes com alta necessidade proteica podem alcançar uma nutrição mais adequada.

O MODO FÁCIL
DE ATINGIR A
META PROTEICA

VS

O MODO
COMPLICADO

Modo complicado:

Iniciar
com fórmula
enteral padrão



Preparar a
suplementação
proteica



Administrar a
suplementação
proteica

Lavar
a sonda

Modo fácil de atingir a meta proteica com Peptamen Intense:⁵

Alto teor proteico: 93 g/L

- 100% proteína do soro do leite: melhor tolerabilidade, absorção e síntese proteica*²-⁴
- Maior oferta de leucina*²
- Auxilia a atingir a meta proteica⁵

Baixo teor de carboidratos: 72 g/L

- Auxilia no controle glicêmico⁶


Alta concentração de TCM (55%):

- Fonte de energia rápida⁷,⁸
- Efeito anti-inflamatório⁹

PEPTAMEN[®] INTENSE

Desenhado
especialmente
para pacientes com alta
necessidade proteica¹

GORDURAS



NÃO CONTÉM GLÚTEN

Referências: 1. Taylor BE, McClave SA, Martindale RG et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). Crit Care Med. 2016; 44:390-438. 2. Pennings B, Boirie Y, Senden JM et al. Whey protein stimulates postprandial muscle protein accretion more effectively than do casein and casein hydrolysate in older men. Am J Clin Nutr. 2011 May;93:997-1005. 3. Marik PE. Feeding critically ill patients the right 'why': thinking outside of the box. A personal view. Ann Intensive Care. 2015;5:51. 4. Abrahão V. Nourishing the dysfunctional gut and whey protein. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2012;15:480-4. 5. Hopkins B, Alberda C. Achieving protein targets in the ICU with a specialized enteral formula. Canadian Journal of Dietetic Practice & Research. 2016;77:pe1-e2. 6. Ochoa JB, Huhmann MB, Files DC et al. Hypocaloric High-protein enteral nutrition improves glucose management in critically ill patients. Presented at Clinical Nutrition Week, Orlando, FL, 2017. 7. Nosaka N, Kasai M, Nakamura M, Takahashi I, Itakura M, Takeuchi H, et al. Effects of dietary medium-chain triacylglycerols on serum lipoproteins and biochemical parameters in healthy men. Biosci Biotechnol Biochem. 2002;66:1713-8. 8. Babayan VK. Medium Chain Triglycerides and structured lipids. Lipids. 1978;22:417-420. 9. Sadeghi S, Wallace FA, Calder PC. Dietary lipids modify the cytokine response to bacterial lipopolysaccharide in mice. Immunology 1999;96:404-10



Onde comprar:
www.nutricaoatevoce.com.br

Para mais informações, acesse: www.nestlehealthscience.com.br
Serviço de atendimento ao profissional de Saúde 0800-7702461 - SMS 25770
Para solucionar dúvidas, entre em contato com seu representante

Material Destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.