

AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA DE ACEITAÇÃO ALIMENTAR

Para **auxiliar no monitoramento** da ingestão de alimentos e/ou tolerância da dieta oferecida, o nutricionista deve perguntar ao acompanhante da criança informações referentes à aceitação alimentar no dia anterior.



Realizar o preenchimento de cada alimento consumido* e a porcentagem total da refeição.

*se a criança consumir a porção total do alimento, preencher as 4 bolinhas (100%) e assim consecutivamente.

ANÁLISE DA REFEIÇÃO

NOME:	LEITO:	ANDAR:
Desjejum	  	<input type="radio"/> Tudo (100%) <input type="radio"/> Mais da metade (75%) <input type="radio"/> Metade (50%) <input type="radio"/> Menos da metade (25%) <input type="radio"/> Nada (0%)
Almoço	    	<input type="radio"/> Tudo (100%) <input type="radio"/> Mais da metade (75%) <input type="radio"/> Metade (50%) <input type="radio"/> Menos da metade (25%) <input type="radio"/> Nada (0%)
Lanche da Tarde	 	<input type="radio"/> Tudo (100%) <input type="radio"/> Mais da metade (75%) <input type="radio"/> Metade (50%) <input type="radio"/> Menos da metade (25%) <input type="radio"/> Nada (0%)
Jantar	    	<input type="radio"/> Tudo (100%) <input type="radio"/> Mais da metade (75%) <input type="radio"/> Metade (50%) <input type="radio"/> Menos da metade (25%) <input type="radio"/> Nada (0%)
Lanche Noturno	 	<input type="radio"/> Tudo (100%) <input type="radio"/> Mais da metade (75%) <input type="radio"/> Metade (50%) <input type="radio"/> Menos da metade (25%) <input type="radio"/> Nada (0%)

AVALIAÇÃO DE ACEITAÇÃO ALIMENTAR DIÁRIA

Tudo (100%)
 Mais da metade (75%)
 Metade (50%)
 Menos da metade (25%)
 Nada (0%)

Caso a criança e/ou adolescente apresente risco nutricional (aceitação alimentar abaixo de 75%), recomenda-se uso de complemento oral e o preenchimento abaixo:

ANÁLISE DE INGESTÃO DO COMPLEMENTO ORAL

Complemento Oral	  
------------------	---

AVALIAÇÃO DE ACEITAÇÃO DIÁRIA DO COMPLEMENTO ORAL

Tudo (100%)
 Mais da metade (75%)
 Metade (50%)
 Menos da metade (25%)
 Nada (0%)

Monitorar a ingestão de alimentos e/ou tolerância da dieta oferecida é medida importante para minimizar a subnutrição e a desnutrição hospitalar em lactentes, crianças e adolescentes e esta é uma ação que precisa ser realizada.

Adaptado de Kondrup J et al. ESPEN, 2002.

Referência:

Gomes, DF et al. Campanha "Diga não à desnutrição Kids": 11 passos importantes para combater a desnutrição hospitalar. BRASPEN J 2019; 34 (1): 3-23.



Loja virtual da Nestlé:
www.nutricaoatevoce.com.br

Para mais informações, acesse: www.avantenestle.com.br
 Serviço de atendimento ao profissional de saúde 0800-7702461

Material destinado exclusivamente a profissionais da saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.

