Whey protein: da UTI à reabilitação pós-alta

Thiago José Martins Gonçalves

Médico Nutrólogo

Especialista em Nutrologia em Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN)

Especialista em Terapia Nutricional Parenteral e Enteral pela BRASPEN

Coordenador clínico das EMTNs dos Hospitais Sancta Maggiore

Otimizando a Terapia Nutricional da UTI à Reabilitação Pós-Alta

A massa muscular esquelética é determinada pelo equilíbrio entre síntese e degradação de proteínas. Além disso, o músculo esquelético pode estar aumentado (músculo hipertrófico) quando a alteração nesse equilíbrio favorece a síntese de proteínas. Por outro lado, a perda de massa muscular esquelética (músculo atrofico), ocorre quando a degradação excede a síntese proteica. Essa perda de massa muscular é uma complicação grave causada por ampla variedade de doenças agudas, como ocorre, por exemplo após a internação prolongada em unidade de terapia intensiva (UTI) e/ou condições crônicas, como envelhecimento, desuso, distrofias musculares, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, sepse, câncer e muitas outras patologias que impactam negativamente na qualidade de vida.¹

A perda do músculo esquelético é um problema quase universal em pacientes sobreviventes de UTI e está associada à morbidade significativa em curto e longo prazo, em geral pela ocorrência de fraqueza muscular e pelo tempo prolongado de suporte ventilatório mecânico. Esse distúrbio é conhecido como **fraqueza adquirida na UTI**, que é caracterizado por miopatia difusa acompanhada por atrofia, infiltração gordurosa e fibrose das fibras musculares, o que costuma ser mais prevalente em pacientes após 7 dias em ventilação mecânica. Além disso, está intrinsecamente relacionada com a disfunção dos nervos periféricos devido ao edema endoneural e à hipoperfusão periférica consequente à hipóxia microvascular do paciente no estado crítico.²

Múltiplos fatores podem desencadear a síndrome da fraqueza adquirida na UTI: intensidade da síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SRIS), imobilidade no leito (desuso), hiperglicemia com resistência periférica à insulina, uso de corticoides em altas doses, uso de sedativos e bloqueadores neuromusculares, balanço hídrico excessivo e terapia nutricional (TN) inadequada, conforme mostrado na **figura 1**.

Figura 1. Fatores precipitantes na síndrome da fraqueza adquirida em unidade de terapia intensiva

Em relação à TN inadequada, pode-se citar a gastroparesia, a intolerância do trato gastrointestinal e os procedimentos realizados na UTI como principais fatores limitantes de um suporte nutricional efetivo no doente crítico. O retardo no esvaziamento gástrico ocorre frequentemente e está associado com a intolerância à nutrição enteral (NE), com consequentes alterações na absorção de nutrientes, podendo estar comprometida por atrofia de vilosidades da mucosa, edema local e perfusão esplâncnica reduzida na vigência de uso de vasopressores.³

Outro fator que limita a otimização da terapia nutricional no doente crítico em síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) é a interrupção da infusão da NE durante a posição prona, amplamente utilizada como estratégia ventilatória para recrutamento de alvéolos na SDRA grave.⁴ Recentes estudos demonstraram segurança, tolerabilidade e eficácia da administração da NE em posição prona, desde que haja protocolos institucionais de gerenciamento de risco e monitorização da TN em UTI.^{5,6}

Já as alterações na composição corporal com perda de quantidade e qualidade da massa muscular em doentes críticos, podem ser observadas a partir da primeira semana de internação. Puthuchery et al. demonstraram uma redução de 17,5% na área transversal do músculo reto femoral em pacientes críticos após 10 dias de ventilação mecânica. Além disso, a perda muscular foi maior naqueles com disfunções orgânicas múltiplas e aumentou o tempo de permanência na UTI.⁷ Herridge et al. avaliaram que as consequências da disfunção muscular em UTI após internação prolongada por SDRA não só ocorrem em curto prazo, mas são observadas redução da capacidade funcional e diminuição na qualidade de vida que permanecem mesmo após 5 anos do evento agudo.^{8,9}

Sendo assim, pode-se citar que a massa e a função muscular durante e após a internação em UTI (**figura 2**) são afetadas em três fases distintas:¹⁰

- *catabólica aguda*: o catabolismo rápido das proteínas musculares devido à resistência periférica à insulina dependente da intensidade da SRIS, pode causar perda intensa de massa e função muscular. Esse processo ocorre ainda durante a internação na UTI;
- *recuperação precoce*: o equilíbrio de proteínas é restaurado. Em seguida, há alguma recuperação da massa e, em menor grau, da função muscular. Isso ocorre após alta da UTI e se mantém por até 1 ano;
- *recuperação persistente*: a recuperação da massa e função muscular ficam estagnadas e o retorno da função muscular é persistentemente menor do que antes da admissão na UTI. Pode ocorrer até 5 anos após a alta da UTI.

Dessa maneira, faz-se necessário criar programas de intervenção interdisciplinares envolvendo o binômio formado por reabilitação motora e estratégias nutricionais com adequada oferta proteica com aminoácidos específicos sinalizadores de síntese proteica em taxas adequadas. Esses fatores são importantes na tentativa de amenizar o desequilíbrio entre a quebra e a síntese de proteínas nos pacientes que sobrevivem à UTI. Além disso, sobreviver à UTI é só o início de uma longa jornada que se estende para a fase de reabilitação e intervenção com monitoramento nutricional, cognitivo e comportamental.^{11,12}

Figura 2. Metabolismo de proteínas na doença crítica e impacto na massa e função muscular. Adaptado de van Gassel R et al., 2020.

Doença Crítica e Metabolismo Muscular

A perda rápida de músculo esquelético em doenças críticas decorre da consequência de um estado catabólico agudo e prolongado, em que a quebra de proteínas musculares excede a taxa de síntese de proteínas (balanço nitrogenado negativo).⁷ Durante doenças críticas, a taxa de catabolismo proteico muscular aumenta acentuadamente, o que parece ser o principal fator do estado hipercatabólico e não uma diminuição na síntese de proteínas, especialmente influenciada pelos altos níveis de citocinas inflamatórias como IL-1, IL-6 e TNF- α , que inicialmente ativam as vias sinalizadoras catabólicas musculares.¹⁰

Nesse contexto, vale lembrar que a via central para a sinalização de uma síntese muscular efetiva está na ativação da proteína mTOR (*mammalian target of rapamycin*) e na regulação do equilíbrio entre a síntese e degradação proteica e, portanto, é importante para o controle do metabolismo muscular esquelético. A mTOR é o regulador celular citoplasmático principal para garantir o tamanho das células musculares, a integração da sinalização de nutrientes (por exemplo, aminoácidos), a regulação por fatores de crescimento (por exemplo, insulina e fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 IGF-1) e o controle de status de energia muscular (ATP) e por modulação da via AMPK.¹³

Os nutrientes se tornam essenciais no processo de ativação da mTOR, pois alguns aminoácidos específicos são necessários e suficientes para essa sinalização inicial da síntese proteica.^{1,13} A mTOR existe como dois complexos proteicos: o complexo mTOR1 e 2 (mTORC1 e mTORC2). O complexo mTORC1 é ativado por aminoácidos e considerado o regulador principal da síntese de proteínas. Após sua ativação, mTORC1 leva a fosforilação e ativação de duas vias de sinalização paralelas envolvidas no controle da transcrição de fatores da síntese proteica: a fosforilação da S6 quinase 1 (S6K1) leva à ativação da proteína ribossômica S6, enquanto a fosforilação do fator de iniciação eucariótico 4E (eIF4E) - proteína de ligação (4EBP1) libera sua inibição da tradução do fator de iniciação eIF-4E, permitindo o início da transcrição e síntese de novas proteínas musculares.¹⁴

Fatores de crescimento (insulina, IGF-1) estimulam o mTORC1 por um mecanismo bem definido, envolvendo a fosforilação de uma proteína quinase - AKT, permitindo que o pequeno homólogo da GTPase chamado Ras (via Rag) se ligue ao mTORC1 e promova sua atividade quinase. Contudo, fatores de crescimento não podem ativar eficientemente o mTORC1 sem a presença de aminoácidos específicos.¹⁵ **Assim, na presença desses aminoácidos ocorre a ativação do mTORC1 através de um mecanismo independente dos fatores de crescimento, modulando o metabolismo das proteínas através desse estímulo, que deve receber considerável atenção como um tratamento potencial nas condições de perda de massa muscular na UTI.**

Whey protein e leucina

Diante desse contexto, a proteína do soro do leite (whey protein) ganha grande destaque pela sua composição nitrogenada formada por diferentes proporções de β -lactoglobulinas, α -lactoalbuminas, lactoferrina e imunoglobulinas. Além disso, contém todos os aminoácidos essenciais para a síntese proteica muscular em concentrações mais elevadas do que outras fontes proteicas, como por exemplo as proteínas vegetais. Além disso, é abundante em leucina (14%) e em outros aminoácidos de cadeia ramificada (26%).¹⁶

O whey protein também é rico em aminoácidos contendo enxofre, como a cisteína e a metionina, que melhoram a função imunológica através da conversão intracelular em glutatona, um potente antioxidante intracelular e, por essa razão, pode favorecer a atividade da glutatona peroxidase, derivado do selênio e cisteína, sendo um antioxidante endógeno que converte peróxidos lipídicos em hidroxíácidos menos prejudiciais, assim controlando o estresse oxidativo celular.^{16,17} Outro componente importante é a lactoferrina, presente no whey protein (1%), que tem propriedades antibacterianas e antivirais, com ações na prevenção do crescimento de organismos patogênicos intestinais, na estimulação do sistema imunológico e na regulação no metabolismo do ferro.¹⁸

Com relação à qualidade proteica, comparando com outras fontes nitrogenadas, o whey protein tem uma maior concentração de leucina e foi demonstrado ter um pico mais rápido e mais efetivo na disponibilidade muscular pós-prandial do que a caseína ou a proteína de soja, embora todas contenham os aminoácidos necessários para estimular a síntese de proteínas musculares.^{1,17} Além disso, o whey protein mostrou preservar a massa muscular durante a perda de peso intencional em adultos obesos, pois peptídeos bioativos gerados a partir da sua hidrólise têm estimulado a liberação de vários hormônios intestinais, incluindo colecistocinina, peptídeo YY, polipeptídeo insulínico dependente de glicose (GIP-1) e peptídeo semelhante ao glucagon (GLP-1) que potencializam a secreção de insulina.¹⁶ Isso pode explicar também a melhor resposta à insulina após a ingestão do whey protein em comparação à caseína ou proteína da soja.

Em doentes críticos, o whey protein facilita a digestão e absorção dos aminoácidos, pois diminui a precipitação e a coagulação de proteínas na cavidade gástrica. Como resultado, o tempo total de esvaziamento gástrico se reduz e a disponibilidade muscular pós-prandial tem concentrações mais elevadas em comparação às outras fontes proteicas. Por isso, são consideradas "proteínas rápidas", pois atingem o jejuno rapidamente, porém, a hidrólise dos peptídeos é mais lenta do que a da caseína, permitindo maior absorção ao longo de todo o comprimento do intestino delgado proximal.¹⁷

Todavia, o ponto mais importante na administração do whey protein para recuperação da massa muscular está na quantidade de leucina, que é seu principal aminoácido essencial e, cujos carbonos derivados da sua transaminação, são a principal fonte de energia do músculo esquelético. Além disso, a leucina estimula a síntese proteica, pela via mTOR e inibe a degradação do músculo esquelético.¹ Recentes estudos demonstram que a leucina diretamente induz o acúmulo de proteína miofibrilar nas células do músculo esquelético e que isso envolve um mecanismo pré-traducional, parcialmente independente da atividade do mTOR.¹³

A leucina modula a síntese e a quebra de proteínas através de dois mecanismos distintos, convergindo na via da 3-fosfatidilinositol quinase (via PI3K-AKT-mTOR). A liberação de insulina estimulada pela leucina, ativa a AKT através do receptor de insulina e de seu substrato (IRS). Contudo, a leucina também pode estimular o mTORC1 através de um mecanismo independente da insulina que envolve a via GTPase relacionada à Ras (Rag). A ativação do mTORC1 estimula a síntese de proteínas através da fosforilação de S6K1 e 4E-BP1 e consequente transcrição de sinalizadores da síntese proteica. A inflamação e estresse oxidativo, comuns durante a perda de massa muscular no doente crítico catabólico, atenuam a ativação de mTORC1, enquanto a ativação crônica de mTORC1 leva à sinalização prejudicada da insulina, devido à resistência periférica

umentada, através de um loop de feedback negativo da S6K1 e do IRS, podendo ser controlada com uma oferta adequada de leucina, conforme mostrado na **figura3**.

Figura 3. O papel da leucina no metabolismo proteico muscular. Adaptado de Melnik BC, 2012.

Concluindo, o whey protein é a fonte proteica ideal no doente crítico e na fase de recuperação muscular pós-alta da UTI, pois tem boa digestibilidade e tolerância no trato gastrointestinal, além da efetiva cinética de absorção, com rápido esvaziamento gástrico e controle do estresse oxidativo gerado pela doença crítica. Além disso, sua composição em leucina fornece proteção contra a perda de massa muscular durante os estágios iniciais da doença crítica e também reduz a expressão de genes de regulação da perda muscular em longo prazo, fazendo com que a fase de recuperação pós-alta da UTI seja mais efetiva e encurtada com melhor modulação dos mecanismos sinalizadores da síntese proteica no músculo esquelético.

Referências: 1 - Ham DJ, Caldwell MK, Lynch GS, Koopman R. Leucine as a treatment for muscle wasting: a critical review. *Clin Nutr.* 2014;33(6):937-945 2 - Latronico N, Bolton CF. Critical illness polyneuropathy and myopathy: a major cause of muscle weakness and paralysis. *Lancet Neurol.* 2011;10(10):931-941 3 - Reintam Blaser A, Preiser JC, Fruhwald S, et al. Gastrointestinal dysfunction in the critically ill: a systematic scoping review and research agenda proposed by the Section of Metabolism, Endocrinology and Nutrition of the European Society of Intensive Care Medicine. *Crit Care.* 2020;24(1):224 4 - Mezidi M, Guérin C. Effects of patient positioning on respiratory mechanics in mechanically ventilated ICU patients. *Ann Transl Med.* 2018;6(19):384 5 - Linn DD, Beckett RD, Foellinger K. Administration of enteral nutrition to adult patients in the prone position. *Intensive Crit Care Nurs.* 2015;31(1):38-43 6 - Saez de la Fuente I, Quintana Estelles MD, et al. Enteral Nutrition in Patients Receiving Mechanical Ventilation in a Prone Position. *JPEN J Parenter Enteral Nutr.* 2016;40(2):250-255 7 - Puthucherry ZA, Rawal J, McPhail M, et al. Acute skeletal muscle wasting in critical illness. *JAMA.* 2013;310(15):1591-1600 8 - Herridge MS, Cheung AM, Tansey CM, et al. One-year outcomes in survivors of the acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med.* 2003;348(8):683-693 9 - Herridge MS, Tansey CM, Matté A, et al. Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome. *N Engl J Med.* 2011;364(14):1293-1304 10 - van Gassel RJJ, Baggerman MR, van de Poll MCG. Metabolic aspects of muscle wasting during critical illness. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2020;23(2):96-101 11 - Toledo DO, Castro MG. *Terapia Nutricional em UTI.* 1ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2015 12 - Wischmeyer PE, Puthucherry Z, San Millán I, Butz D, Grocott MPW. Muscle mass and physical recovery in ICU: innovations for targeting of nutrition and exercise. *Curr Opin Crit Care.* 2017;23(4):269-278 13 - Haegens A, Schols AM, van Essen AL, van Loon LJ, Langen RC. Leucine induces myofibrillar protein accretion in cultured skeletal muscle through mTOR dependent and -independent control of myosin heavy chain mRNA levels. *Mol Nutr Food Res.* 2012;56(5):741-752 14 - Melnik BC. Excessive Leucine-mTORC1-Signalling of Cow Milk-Based Infant Formula: The Missing Link to Understand Early Childhood Obesity. *J Obes.* 2012;2012:197653 15 - Jewell JL, Russell RC, Guan KL. Amino acid signalling upstream of mTOR. *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2013;14(3):133-139 16 - Marik PE. Feeding critically ill patients the right 'whey': thinking outside of the box. A personal view. *Ann Intensive Care.* 2015;5(1):51 17 - Abrahão V. Nourishing the dysfunctional gut and whey protein. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2012;15(5):480-484 18 - Rosa L, Cutone A, Lepanto MS, Paesano R, Valenti P. Lactoferrin: A Natural Glycoprotein Involved in Iron and Inflammatory Homeostasis. *Int J Mol Sci.* 2017;18(9):1985.

Loja virtual da Nestlé:
www.nutricaoatevoce.com.br

NHS000327

Para mais informações, acesse: www.avantenestle.com.br
Serviço de atendimento ao profissional de saúde 0800-7702461

Material destinado exclusivamente a profissionais de saúde. Proibida a distribuição aos consumidores.